

Faktablad till medicinsk personal

Produkt: **Sanera Sot & Olja 17212**

Datum: 2020-01-16

Förteckning över beståndsdelar		
Ämnesnamn	CAS-nummer	Viktprocentintervall
Natriummetasilikatpentahydrat	10213-79-3	10 % eller mer
Natrium-N- (2-karboxietyl) -N- (2-etylhexyl) -β-ala	94441-92-6	1 % och däröver, men mindre än 10 %,
Alcohol ethoxylate (C9-C11) < 2.5 EO	68439-46-3	1 % och däröver, men mindre än 10 %,
Kvatemär C12-14 alkyl metylamin etoxylat metylklorid ¹	1554325-20-0	1 % och däröver, men mindre än 10 %,
Kaliumhydroxid	1310-58-3	1 % och däröver, men mindre än 10 %,
Tetranatrium-N, N-bis (carboxylatomethyl) -L-glutamat	51981-21-6	1 % och däröver, men mindre än 10 %,
Vatten	7732-18-5	1 % och däröver, men mindre än 10 %,

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Begär omedelbar läkarvård och visa produktens säkerhetsinformation.

Vid inandning:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig att andas in. Vid eventuella förgiftningssymptom bör dock den drabbade flyttas från exponeringsplatsen till frisk luft och hållas lugn. Sök läkare om symptomen inte upphör.

Vid hudkontakt:

Tag av nedstänkta kläder och skor, spola huden eller, om det är lämpligt, duscha den drabbade med mycket kallt vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador. Tag inte av kläderna om blandningen ger brännsår eller frysskador eftersom skadan då kan förvärras. Eventuella blåsor får aldrig punkteras eftersom det ökar risken för infektion.

Vid ögonkontakt:

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla inte kräkning eftersom produkten då kan skada slemhinnan i matstrupen och komma ner i lungorna. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen. Vid medvetslöshet, ge inget via munnen innan läkare har konsulterats. Låt den drabbade vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: